



Impfempfehlung im 2. Lebensjahr

Masern-Mumps-Röteln Impfung:

ab 9 Monaten (Impfstoff kostenfrei im Rahmen des Gratis-Impfprogramms; die Impfung gibt es seit 1963)

Masern: Viruserkrankung, die mit Husten, hohem Fieber und Hautausschlägen einhergeht. Bei jedem 100. Kind kommt es zu einer Lungenentzündung, bei jedem 1000. zu einer Hirnentzündung. Im Jahr 2000 gab es etwa 800.000 Todesfälle durch Masern in der Dritten Welt, in Österreich seit 1997 zehn Panenzephalitis-Tote.

Mumps: Viren verursachen fieberhafte Infekte mit Schwellungen der Speicheldrüsen und auch der Hoden, die zu einem hohen Prozentsatz zu Unfruchtbarkeit führen können.

Röteln: Fieberhafter Infekt mit Schwellung der Lymphknoten und Gelenkschmerzen. Bei Schwangeren kommt es sehr häufig zu schweren Fehlbildungen des Embryos.

Feuchtblattern-Impfung:

ab 9 Monaten (2x impfen, je 65 €)

Varicellen („Schafblattern“, Windpocken): Juckender Ausschlag mit oft starker Narbenbildung, nicht selten kann es auch zu Kleinhirn-Entzündung kommen. Impfung schützt zu einem hohen Prozentsatz, in jedem Fall Schutz vor schweren Verläufen. Falls nicht durchgemacht, im Volksschulalter nachholen.

Vierfach-Impfung: Masern-Mumps-Röteln-Varicellen Impfstoff (112 €)

Vorteil: dem Kind werden 2 Stiche erspart
Nachteil: kostenfreier Betrag entfällt

Meningokokken – bakterielle (eitrige) Hirnhautentzündung (hohes Risiko im Alter 0-5 Jahre, pro Jahr ~5-10 Todesfälle, hohe Rate an bleibenden Behinderungen)

Die *Meningokokken-Meningitis* ist eine schwere Erkrankung, die mit hohem Fieber und Nackensteifigkeit einhergeht. Es gibt 5

wesentliche Untergruppen des Erregers, bei uns sind vor allem die Gruppe B (etwa 65% der Fälle) und Gruppe C (etwa 30% der Fälle) vorherrschend. Pro Jahr gibt es in Österreich etwa 20-40 schwere Meningokokken-Erkrankungen.

B-Meningokokken: Bexsero® = Impfstoff gegen Gruppe B-Meningokokken. 3x zu impfen; Vorteil: guter Schutz vor schwerer Erkrankung, *Nachteil:* schmerzhaft, macht oft Fieber, teuer, je Impfung 140 €

C-Meningokokken: Neisvac® = Impfstoff gegen Gruppe C-Meningokokken. 1x impfen schützt 10 Jahre, gut verträglich, deckt ca 1/3 der Fälle ab; 56 €

Meningokokken A/C/W/Y: Nimenrix® = Vierfach-Meningokokken-Impfstoff.

Im Vierfachimpfstoff sind die bei uns häufigeren Stämme C + Y enthalten. A + W treten in Afrika und Asien häufig auf (Ägypten, Türkei, Arabien). Empfohlen bei Reisen, gut verträglich; 70 €

FSME: „Zeckenschutzimpfung“, ab 12 Mo impfen, vorziehen möglich ab 6 Mo, gut verträglich (je 45 €/ Impfkation 29 €)

Bei FSME kann es nach Zeckenstich zu hohem Fieber und einer Entzündung des Gehirns kommen. In den ersten zwei Lebensjahren sind FSME-Erkrankungen jedoch sehr selten.

Zur Grundimmunisierung 3x impfen (Abstand 0 / 1-3 / 6-12 Monate).

Hepatitis-A-Impfung: 2x impfen, je 37 € Hepatitis A wird bei mangelnder Hygiene durch verunreinigtes Wasser verursacht, es kommt zur so genannten „Reisegelbsucht“ mit heftigen Brechdurchfällen, die mehrere Wochen andauern. Im Kindesalter gibt es zwar keine chronischen oder tödlichen Verläufe, aber für Familien, die viel ins Ausland reisen, ist die Impfung empfehlenswert. Gut verträglich, Schutz hält für mindestens 20 Jahre.